

# EHBT: Eerste Hulp Bij Tandongevallen

## Trauma van melktanden

- de tand is VERPLAATST
- De tand is GEBROKEN
- De tand is UITGESLAGEN



Probeer een melktand NIET zelf terug op z'n plaats te duwen.



Ga dezelfde dag naar de tandarts.

### Waarom een uitgeslagen melktand NIET terugplaatsen?

Bij het terugplaatsen van een melktand bestaat het risico dat de onderliggende kiem van de definitieve tand beschadigd wordt.

De tandarts kan hierover het best oordelen.

## Voorkomen is beter dan genezen !

Bij het beoefenen van contactsporten ( hockey, boksen, rugby, basketbal,...) is het verstandig een gebitsbeschermer te dragen.

Er bestaan verschillende soorten mondbescherming :



- een 'Prefab' direct bruikbare mondbeschermer
- een 'Boil and Bite' beschermer
- een volledig op maat gemaakte gebitsbeschermer

Deze beschermers verschillen sterk in pasvorm of in de mate van bescherming en de keuze hangt ook af van de individuele noden of eisen.

Vraag raad aan uw tandarts.



**Weekends en feestdagen**

**Wachtdienst Tandarts**

van 9.00 tot 18.00 uur

☎ 0903 39969

Met dank aan Prof. Dr. Luc Martens (UGent) en Prof. Dr. Dominique Declerck (KULeuven) voor hun medewerking en aan tandartsassistente Lisa Verstraete voor de grafische ondersteuning.